

Skills	i.v. Infusionen richten und verabreichen	Bewertung
Indikation	Einbringen von Nährstoffen, Flüssigkeit, Elektrolyte oder Medikamente über einen peripheren / zentralen Venenkatheter	
Kontraindikation	bei verstopften oder paravenösen Venenkatheter, Venenentzündung (Phlebitis)	
Vorbereitung der Materialien (ggf. Funktionsprüfung)	<ul style="list-style-type: none"> • Einmalhandschuhe, sterilisierte • Infusionsbehälter • Infusionsständer • Infusionsbesteck • Pflaster • Tupfer, sterilisierter • Tablett 	
Vorbereitung des Pflegeempfängers	Positionierung auf Arbeitshöhe (im Liegen oder Sitzen)	
	störende Kleidung / Materialien entfernen (Privats- u. Intimsphäre beachten)	
	Arbeitsmittel, -fläche (Ablage, Abwurf) in Reichweite	
Durchführung der Maßnahme	Verschlussring von der Infusionsflasche abziehen	
	Infusionsbesteck aus Verpackung entnehmen	
	Verschlusskappe von Einstichdorn abnehmen und diesen durch den Gummistopfen in den Infusionsbehälter stechen	
	Rollklemme zudrehen, Infusionsbehälter aufhängen	
	Tropfenkammer bis zur Markierung füllen (Belüftungsventil bei Glasflaschen öffnen)	
	Rollklemme aufdrehen und Lösung langsam durch das System fließen lassen, sodass keine Luft im Schlauch verbleibt	
	Einmalhandschuhe anlegen, Tupfer unter Venenverweilkanüle legen	
	Schlauchsystem an die liegende Venenverweilkanüle anschließen	
	Tropfgeschwindigkeit nach ärztlicher Anordnung einstellen	
	Schlauchsystem evtl. mit Pflaster abknickungsfrei am Unterarm fixieren	
Information an den Pflegeempfänger	Bezüglich des Ergebnisses, erste fachliche Einschätzung und weiters Vorgehen	