

Skills	palpatorische Pulsmessung (A. radialis)	Bewertung
Indikation	ertasten der Blutwellen an den arteriellen Gefäßwänden bezüglich Frequenz, Qualität, Rhythmus bei Überwachung des Herz-Kreislaufs, Vitalzeichenkontrolle, Schellong-Test I + II	
Kontraindikation	keine	
Vorbereitung der Materialien (ggf. Funktionsprüfung)	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitmesser (z.B. Pulsuhr) 	
Vorbereitung des Pflegeempfängers	Positionierung auf Arbeitshöhe (im liegen oder sitzen)	
	störende Kleidung / Materialien entfernen (Privats- u. Intimsphäre beachten)	
	Arbeitsmittel, -fläche (Ablage, Abwurf) in Reichweite	
Durchführung der Maßnahme	Messung erfolgt an der Speichenschlagader an der Daumenseite des Handgelenks, Hand liegt locker und geöffnet auf	
	Zeige-, Mittel- und Ringfinger auf den Pulsort legen und Arterie mit sanftem Druck nach unten (knochenwärts) drücken	
	bei Normalwerten Pulsschläge 15 Sek. lang auszählen und Ergebnis mit 4 multiplizieren (= Schläge pro Minute)	
	bei Herzrhythmusstörungen o. Erstmessung eine volle Minute auszählen	
	beim Auszählen (Frequenz) auf Rhythmus und Qualität achten	
Information an den Pflegeempfänger	Bezüglich des Messwertes, erste fachliche Einschätzung und weiters Vorgehen	